



## استمارة إعلام مريض حول جراحة الاستئصال الجزئي للحنجرتة الصوتية بالليزر

سيدي، سيدي،  
يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.

### المخاطر والمضاعفات

- أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.  
- قد يصاحب عملية الاستئصال الجزئي للحنجرتة الصوتية آثار جانبية كغيرها من الجراحات، وتحدث هذه الآثار نتيجة إزالة جزء من الحنجرتة الصوتية أو إزالتها بأكملها، ومن أبرز هذه الآثار الجانبية ما يلي: بحة في الصوت أو فقدان القدرة على إنتاج معظم الأصوات.

### المضاعفات قريبة المدى

في أعقاب العملية مباشرة، قد تحدث مشاكل في البلع. تورم الفم والحلق أو تنميل في منطقة الحلق والرقبة. يستغرق التعافي بعد هذه الجراحة بعض الوقت وينبغي في هذه الفترة الحرص على إراحة الصوت بشكل تام مدة 3 إلى 7 أيام على الأقل، وتتمثل إراحة الصوت على الامتناع عن التحدث نهائياً أو حتى الهمس، وكذلك تجنب السعال أو تنظيف الحلق (النحنحة)، إذ أن استخدام الصوت خلال فترة التعافي قد يؤثر على عملية الشفاء ويؤخرها.

### المضاعفات الاستثنائية

- فقدان الصوت.  
- امكانية عودة المرض.

### تعليمات بعد العملية

- تناول العلاج الموصوف يمكن من التعافي السريع.  
- استعمال مذيبات البلغم لتهدئة السعال مع تجنب القيام بأي نشاط بدني شاق.  
- الامتناع عن الغناء و استعمال الآلات الهوائية حتى يتم الترخيص من قبل الطبيب.  
- الالتزام بالتأهيل الوظيفي للحنجرتة الصوتية كما ينص عليه الطبيب.

- للتعرف على جراحة الاستئصال الجزئي للحنجرتة الصوتية بالليزر، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر منك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساراتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...). ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

### الهدف من الجراحة

- الحنجرتة الصوتية هي عضلات توجد في الحنجرة، تهتز لإصدار الصوت، كما أنها تلعب دوراً في عملية التنفس والبلع.

تهدف جراحة الاستئصال الجزئي للحنجرتة الصوتية بالليزر إلى:

- إزالة الجزء المريض منها لعلاج العديد من الحالات الطبية أبرزها الورم الحميد أو الخبيث للحنجرة في مراحلها المبكرة.  
- توسيع مجرى الهواء في حال وجود شلل في الحنجرتة الصوتية.

### مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.  
- تتضمن هذه الجراحة استخدام مع منظار يتم إدخاله عبر الفم، حيث يعمل ليزر ثاني أكسيد الكربون على استئصال الجزء المصاب بدقة شديدة ويساعد المنظار المزود بكاميرا في توضيح الرؤية للطبيب أثناء الجراحة. يتم إزالة الورم وجزء من الأنسجة السليمة المحيطة به لضمان إزالة جميع الخلايا السرطانية أو إزالة جزء من الحنجرتة لتوسيع مجرى التنفس. تتسم جراحة استئصال الحنجرتة الصوتية بالليزر بقلة آثارها الجانبية وسرعة فترة الشفاء مقارنة بالجراحة التقليدية.