

استمارة إعلام مريض حول جراحة التنظير المباشر للحنجرة

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة التنظير المباشر للحنجرة ، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.
- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم ...)، ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

المخاطر والمضاعفات

- أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرّض لحدوث مضاعفات، حتى لو تم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

- في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث:
• نظراً لموضع الرأس، قد تعاني من آلام في الرقبة في الأيام الموالية للعملية.
- قد تتسبب الأدوات الجراحية في جروح في اللسان والشفاه واللثة. وبشكل استثنائي، قد يحدث ضرر للأسنان، أو حتى فقدان سن أو أكثر. يزداد احتمال خلع أو فقدان الأسنان كلما كانت حالتها سيئة، خاصة إذا كانت متحركة. من المهم أن تُذكر جراحك وطبيب التخدير بذلك.
- نظراً لإدخال الأنبوب عن طريق الفم، قد يستمر الشعور بعدم الراحة عند البلع لبضعة أيام، بالإضافة إلى صعوبة فتح الفم.
- صعوبة في التنفس التي قد تتطلب إطالة فترة التهوية أو حتى إجراء فتحة في القصبه الهوائية.

المضاعفات بعيدة المدى

قد يبقى صوتك مُتغيّراً، بل أحيانا يزداد سوءاً بسبب وجود ندبات في الحبال الصوتية، أو بسبب إعادة الإصابة بالمرض الأصلي.

المضاعفات الاستثنائية

- تسرب الهواء إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر.
- اضطرابات في حاسة التذوق.
- في حالة استخدام الليزر:
• التهاب غضروف الحنجرة الذي قد يؤدي إلى صعوبة في البلع أو تغير في الصوت.
- حروق جلد الوجه أو العينين أو أغشية مخاطية الفم والبلعوم استثنائياً.
- تضيق الحنجرة مما قد يتسبب في حدوث ضيق تنفس.

الهدف من الجراحة

تنظير الحنجرة هو اختبار تشخيصي ذي أهمية بالغة، يمكن من الكشف عن أورام أو إصابات في منطقة الحنجرة. تهدف جراحة التنظير المباشر للحنجرة إلى:
• تحديد نوع الإصابة ومدى انتشارها على مستوى الحنجرة.
• أخذ عينة من الخلايا بغاية تحليل الأنسجة.
• إجراء تدخل علاجي حنجري لورم حميد أو خبيث.

مراحل الجراحة وما بعدها

تتم هذه الجراحة، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
يُدخّل المنظار من خلال الفم ويُستند على الأسنان عبر واقيّ للأسنان. تُستخدم الأدوات تحت سيطرة المجهر الجراحي أو العدسات.
تتم التوصية بفترة راحة صوتية بعد الجراحة في بعض الحالات.
يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.