



## استمارة إعلام مريض حول جراحة التنظير الصلب للقصبات الهوائية

### المخاطر والمضاعفات

أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

### المخاطر قريبة المدى

في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث :  
- بسبب الأدوات الجراحية المستخدمة، ضغط على الشفاه أو اللسان، أو جرح صغير في تجويف الفم، أو إصابة في الأسنان خاصة إذا كانت هشّة.

- الالتهابات الحنجرية، التي قد تؤدي إلى ضيق في التنفس، نتيجة تورم وانتفاخ ويتطلب ذلك رعاية طبية مناسبة. وقد يكون من الضروري في بعض الأحيان إجراء عدة مناظير إذا لم يتم إزالة كامل الأجسام الغريبة في المرة الأولى بسبب الظروف المحلية (التهاب أو نزيف لغشاء المخاط).

- قد تسبب الالتهاب المنجرة عن وجود جسم غريب بعد المنظار الى ضرورة تنفس اصطناعي لفترة مع وجود خطر على حياة المريض.

### المخاطر بعيدة المدى

قد يحدث تعفن جرثومي في الشعب الهوائية والرئة مما قد يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية والعلاج الطبيعي، مع إجراء تصوير إشعاعي للصدر. هذه المضاعفات مرتبطة بوجود أجسام غريبة من طبيعة نباتية أو أجسام غريبة قديمة لم يتم اكتشافها مسبقاً.

### المضاعفات الخطيرة أو الاستثنائية

نادراً ما قد تتسبب هذه الجراحة في:  
- ضيق حاد في التنفس قد يتطلب إجراء عملية فتحة في القصبة الهوائية.  
- نزيف حاد في مجرى الهواء وإجراء تدخل طارئ عن طريق الصدر بهدف إيقاف النزيف.  
- انفصال رئوي والذي قد يستدعي تصريف الهواء لبضعة أيام.  
- هذا التنظير مع وجود الجسم الغريب يشكل خطراً على حياة المريض .

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة التنظير الصلب للقصبات الهوائية، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر بأي حالة تحسس وجميع العلاجات التي قد يتناولها طفلك. ولا تنسى إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

### الهدف من الجراحة

- قد يمر جسم غريب بطريق الخطأ في القصبة الهوائية أو الشعب الهوائية، مما قد يتسبب في ضيق في التنفس بدرجات متفاوتة أو مضاعفات على الشعب الهوائية والرئتين. قد يكون وجود هذا الجسم الغريب متأكداً أو مشتبهاً فيه فقط على أساس سير الأحداث التي أدت إلى التماس العناية الطبية.

- تهدف جراحة التنظير الصلب للقصبات الهوائية إلى رؤية الحنجرة و القصبات الهوائية مباشرة باستخدام منظار الصلب وإخراج الأجسام الغريبة الموجودة. يتم ذلك لاستعادة وظيفة التنفس الطبيعية ومنع حدوث مضاعفات.

### مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.

يقوم الطبيب بإدخال أنبوب صلب عبر الفم، ثم الحنجرة، حتى يصل إلى القصبة ثم الشعب الهوائية. يتم استخدام أنواع مختلفة من الأدوات لإزالة الأجسام الغريبة.

- عادة يتم الاحتفاظ بالمريض في المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل لغرض المراقبة و الكشف عن أي مضاعفات محتملة. في بعض الحالات، قد تكون عملية فتح الصدر ضرورية؛ وهذه العملية تنطوي على مخاطر خاصة بها.

يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.

