



استمارة إعلام مريض حول جراحة التعفن الجرثومي لأنسجة الوجه و الرقبة

المخاطر والمضاعفات
أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية
في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث:
- نزيف حاد أو تجمع كتلة دموية في منطقة العملية كما هو وارد في أي عملية جراحية نادراً ما يكون كثيفاً وقد يتطلب الأمر تدخلاً لإيقافه أو تصريفه.
- تطور التعفن رغم الجراحة في موضع الجراحة أو التهاب مع انتفاخ وتورم.
- تكون تقيحات جديدة تستدعي تدخل جراحي ثاني.
- آلام في الرقبة، عادة ما تكون عابرة، بالإضافة إلى آلام في منطقة الجرح وعند البلع.

المضاعفات بعيدة المدى
- يمكن لبعض المساحات الجلدية أن تبدو كأنها مخدرة، غالباً بصفة وقتية.
- يمكن ان يصبح الجرح سميكا و سيء المنظر.

المضاعفات الاستثنائية
- نادر ما تحدث إصابة بعض أعصاب الوجه والرقبة فيمكن الشعور بالآلام و قصور عند تحريك الكتف و الذراع أو اضطراب عند تحريك الجزء السفلي للوجه، غالباً بصفة وقتية.

سيدتي، سيدي،
- للتعرف على جراحة التهابات أنسجة الوجه و الرقبة، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.
- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...) ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة
- تهدف جراحة الالتهابات الجرثومية لأنسجة الوجه والرقبة إلى تصريف التقيحات واستئصال الأنسجة المتلفة عبر شق جراحي.

مراحل الجراحة وما بعدها
- تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
تتمثل الجراحة في:
- شق جراحي في مكان الالتهاب يكون امتداده حسب موضع وانتشار التقيحات،
- تصريف القيح واستئصال الأنسجة المتلفة،
- غالباً، أخذ بعض العينات (قيح أو أنسجة) لإجراء اختبارات بكتيرية أو تحليل أنسجة،
- وضع شريط داخل الجرح لتصريف الإفرازات القيحية والدموية.
- يقع تطهير الجرح في غالب الأحيان، يوميا وتتم إزالة شريط التصريف حسب تطور الحالة.
- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.