



استمارة إعلام مريض حول جراحة استئصال اللوزتين

المخاطر والمضاعفات

أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

- احترام النظام الغذائي المتفق عليه مع طبيبك يحمي من بعض المضاعفات.

المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد تحدث:

-الآلام في الحلق متفاوتة، تدوم من 5 الى 7 أيام، عادة ما تكون خفيفة بعد الاسبوع الأول، و الام في الأذن، و هذا أمر معتاد في فترة ما بعد الجراحة.

- تورم طفيف على مستوى اللسان أو الشفة أو سقف الفم واللهاة.

- نزيف حاد قد يتطلب علاجاً إضافياً وإقامة أطول في المستشفى.

المضاعفات الاستثنائية

- أضرار في الأسنان (الأسنان اللبنية خصوصاً).

- نزيف، يحدث بين اليوم السابع إلى الخامس عشر بعد العملية، يجب إبلاغ الجراح به وقد يتطلب عملية إرقاء تحت التخدير العام .

- صعوبات في الأكل و تناول الأدوية المسكنة، قد تؤدي إلى سوء التغذية.

- تغييرات في الصوت أو ارتجاع السوائل من الأنف، قد تحتاج إلى تقويم وظيفي.

- استنشاق الدم عند التدخل ينجر عنه حدوث لعدوى القصبة الرئوية ويتطلب علاجاً طبياً.

-في حالات نادرة، يمكن حدوث عدوى في الرقبة مع ظهور حمى وانتفاخ و تيبس الرقبة ، مما يتطلب استشارة طارئة مع الطبيب.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة استئصال اللوزتين ، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساراتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم ...) . ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

يقع الالتجاء إلى جراحة استئصال اللوزتين:

- لعلاج اضطرابات التنفس أثناء النوم،

- في حالة التهاب اللوزتين المتكرر أو المزمن أو الشديد،

- لأخذ عينة للفحص المخبري إذا كان هناك شك في وجود أورام.

مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.

- تجرى الجراحة عبر الفم، دون جرح جلدي.

- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.

- بداية من اليوم الاول يتكون غشاء ابيض يكسو مكان اللوزتين المستأصلتين وهو طبيعي. يختفي تدريجياً مع التأم الجروح.