



استمارة إعلام مريض حول جراحة فرط نشاط الغدد جارات الدرقية

- عادة ما يضع الجراح في نهاية العملية أنبوب لشطف الإفرازات في منطقة العملية يتم الاحتفاظ به حسب الحاجة.
- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.

المخاطر والمضاعفات

أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث:
- نزيف حاد أو تجمع كتلة دموية في منطقة العملية كما هو وارد في أي عملية جراحية نادراً ما يكون كثيفاً وقد يتطلب الأمر تدخلاً لإيقافه أو تصريفه.
- تعفن في موضع الجراحة أو التهاب مع انتفاخ وتورم.
- الآم في الجزء الخلفي من الرقبة، والتي عادة ما تكون عابرة، بالإضافة إلى الآم في منطقة جرح العملية وعند البلع.
- تنميل، تقلصات عضلية، وضعف عام ناتج عن نقص في مستوى الكالسيوم في الدم بعد استئصال الغدد الجار درقية، يتم علاجها بمكملات الكالسيوم وفيتامين د. متابعة الحالة بانتظام مهمة لضمان استقرار مستويات الكالسيوم.
- بحة أو ضعف في الصوت ناتج عن تضرر أعصاب الحبال الصوتية الموجودة خلف الغدة الدرقية عادة ما تكون وقتية.

المضاعفات بعيدة المدى

- نادراً ما يصبح الجرح سميكاً وسيء المنظر.

المضاعفات الاستثنائية

- قد يحدث شلل من الجهتين لأعصاب الحبال الصوتية، مما قد يستلزم إجراء فتحة في القصبة الهوائية للتنفس.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة فرط نشاط الغدد جارات الدرقية نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.
- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...) ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

- فرط نشاط الغدد جارات الدرقية هو اضطراب ينجم عن زيادة في مستوى هرمون الغدة الجار درقية، الذي يتحكم في مستويات الكالسيوم في الجسم، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل هشاشة العظام، تراكم الكالسيوم في الكلى، ضعف العضلات، وحتى اضطرابات في القلب.
- قد يكون هذا الفرط ناتجاً عن تضخم غدة واحدة أو أكثر من الغدد الجار الدرقية مثل وجود ورم غدي حميد في إحدى الغدد، أو تضخم كل هذه الغدد نتيجة لفشل كلوي مزمن، أو غيره من الأسباب.
- الهدف من جراحة فرط نشاط الغدد جارات الدرقية هو استئصال الغدة أو الغدد التي تسبب إفرازاً مفرطاً لهرمونها، لاستعادة التوازن الطبيعي للكالسيوم في الجسم، مما يساهم في الوقاية من هذه المضاعفات.
- قبل الجراحة، سيطلب منك الطبيب إجراء بعض الفحوصات الطبية، مثل اختبارات الدم، وصور الأشعة لتحديد الغدة أو الغدد المتضخمة.

مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
- يقوم الجراح بفتح جرح أفقي في أسفل الرقبة ثم تحديد واستئصال الغدة أو الغدد المتضخمة.