



استمارة إعلام مريض حول جراحة استئصال العقد اللمفاوية في الرقبة

المخاطر والمضاعفات

أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرّض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

بعد العملية قد يحدث:

- نزيف حاد أو تجمع كتلة دموية في منطقة العملية كما هو وارد في أي عملية جراحية وقد يتطلب الأمر تدخل لإيقافه أو تصريفه.
- تعفن في موضع الجراحة أو التهاب مع انتفاخ وتورم.
- آلام في الجزء الخلفي من الرقبة، والتي عادة ما تكون عابرة، بالإضافة إلى آلام في منطقة جرح العملية وعند البلع.

المضاعفات بعيدة المدى

- يمكن لبعض المساحات الجلدية أن تبدو كأنها مخدرة، غالباً بصفة وقتية.
- يمكن ان يصبح الجرح سميكاً و سيء المنظر.

المضاعفات الاستثنائية

- يمكن الشعور بالألم وقصور عند تحريك الكتف و الذراع أو اضطراب عند تحريك الجزء السفلي للوجه، غالباً بصفة وقتية.
- يمكن ظهور إفرازات لمفاوية غالباً ما تنتهي بفضل العناية الموضعية.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة استئصال العقد اللمفاوية، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر بأي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...). ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

تهدف هذه الجراحة إلى استئصال كلي أو جزئي لعقدة أو عقد لمفاوية لأغراض تشخيصية.

مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
- يقوم الجراح بفتح جرح مقابل العقدة اللمفاوية، في احدى ثنايا الجلد إن أمكن، ثم الولوج إلى العقد اللمفاوية واستئصالها.
- يقع إجراء التحليل الفوري للأنسجة في أغلب الحالات، ولكن النتيجة ليست نهائية ولا يمكن الاعتماد عليها بنسبة 100%. حسب نتائج التحليل، قد يتطلب العلاج تواصل العملية أو مكملات جراحية أخرى.
- يمكن القيام بتحليل بكتريولوجي حسب الحاجة.
- عادة ما يضع الجراح في نهاية العملية أنبوب واحد أو أكثر لشطف الإفرازات في منطقة العملية، يتم الاحتفاظ به حسب الحاجة.
- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.