

استمارة إعلام مريض حول جراحة استئصال الغدة اللعابية تحت الفك السفلي

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة استئصال الغدة اللعابية تحت الفك السفلي نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...)، ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

تهدف جراحة استئصال الغدة اللعابية تحت الفك السفلي إلى استئصال الغدة إِمّا لأنها تحتوي على ورم يجب تحديد طبيعته (الحميدة أو الخبيثة)، أو لأن الغدة مصابة بالتهاب مزمن بسبب وجود حصى (لا يمكن معالجتها عن طريق التنظير) أو لأسباب أخرى.

مراحل الجراحة وما بعدها

تتم هذه الجراحة، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والإنعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والإنعاش قبل العملية.

تُجرى العملية بعمل شق جلدي، قبالة الغدة العيبية المصابة، في الجزء العلوي من الرقبة أسفل عظم الفك السفلي. تفصل الغدة بعيدا عن العضلات المجاورة والأوعية والأعصاب ثم تتم ازالتها. إذا احتوت الغدة على ورم، يتم ارسالها لقسم تحليل الانسجة للتحليل المجهرى الفوري لتحديد طبيعتها. إذا كان الورم خبيثا يجب استئصال العقد اللمفاوية المحيطة بالغدة وتحليلها. في هذه الحالة قد يلزم استئصال العقد اللمفاوية الموجودة على جانب الرقبة ويتم وضع أنبوب تصريف مكان الجرح، يقوم الطبيب بإزالته في الوقت المناسب.

المخاطر والمضاعفات

- أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، حتى لو تم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقًا للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث:

- نزيف حاد أو تجمع كتلة دموية في منطقة العملية، نادرا ما يكون كثيفا وقد يتطلب الأمر تدخلا لإيقافه أو تصريفه.
- تعفن في موضع الجراحة أو التهاب مع انتفاخ وتورم.
- الألم في منطقة العملية يكون عادة طفيفا نسبيا.
- إصابة عرضية في فرع الذقن من العصب الوجهي، ينجر عنها اختلال توازن فتح الفم عند تحريكه.

المضاعفات بعيدة المدى

- نادرا ما يصبح الجرح سميكا وقبيح المنظر.
- الشعور بالخدر في منطقة أسفل الفك.

المضاعفات الاستثنائية

- حدوث التصاقات مكان الغدة أثناء العملية وخاصة في الجزء العميق من اللسان.
- تضرر العصب الموجود تحت اللسان والمسؤول عن حركة اللسان، فيتسبب في شلل له عواقب طفيفة على البلع والكلام.
- قد يحدث تضرر في العصب اللساني والذي يمكن أن يسبب درجات متفاوتة من الخدر أو التنمل في جانب واحد من اللسان بالإضافة إلى ألم في الفم واللسان.