

استمارة إعلام مريض حول جراحة تركيب أنبوب تهوية الأذن الوسطى للأطفال أو البالغين

المخاطر والمضاعفات

- أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، حتى لو تم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد تحدث إفرازات من الأذن. قد تكون هذه الإفرازات دموية أو ملوثة، قد يشجع على الطرد المبكر لجهاز التهوية. يجب إبلاغ الجراح إذا استمرت الإفرازات لأكثر من بضعة أيام.

المضاعفات بعيدة المدى

- قد يصبح جهاز التهوية مسدوداً. في هذه الحالة، قد تتكرر الحالة المرضية في الأذن.
- بمجرد طرد جهاز التهوية، يصبح الشفاء هو القاعدة ولكن ومع ذلك، يمكننا أن نلاحظ:
- تصلب طبلة الأذن،
- تكرار الحالة المرضية،
- ثقب متبقي في الغشاء الطبلي، والذي قد يتطلب جراحة أخرى.

المضاعفات الاستثنائية

- في حالات نادرة، قد ينتقل جهاز التهوية خلف طبلة الأذن.
- في حالات استثنائية جداً، تم الإبلاغ عن فقدان السمع بشكل كبير، طنين في الأذنين، دوار، ورم كوليسترولي (السوسة) خلف طبلة الأذن.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة تركيب أنبوب تهوية الأذن الوسطى للأطفال أو البالغين ، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر منك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...)، ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

تهدف جراحة تركيب أنبوب تهوية الأذن الوسطى إلى تعزيز تهوية الأذن الوسطى في الحالات التالية:
- التهاب الأذن الوسطى المخاطي، مع نقص في السمع. هذا الانخفاض في السمع يمكن أن يكون مصدرًا للتأخر اللغوي أو المشاكل السلوكية أو صعوبات في المدرسة. يمكن أن يتطور أيضًا إلى التهاب الأذن المزمن مع مضاعفات أخرى، مثل فقدان السمع بسبب تلف في عظيمات الأذن.
- تراجع طبلة الأذن.
- التهاب الأذن الوسطى الحاد المتكرر.

مراحل الجراحة وما بعدها

تتم هذه الجراحة، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والإنعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والإنعاش قبل العملية.
يتم وضع أنبوب التهوية عبر ثقب في طبلة الأذن، تحت المجهر.

يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.
لتفادي التعفن يجدر أن يلتزم المريض بعدم ادخال الماء الى اذنه.