



استمارة إعلام مريض حول جراحة إصلاح طبلة الأذن

المخاطر والمضاعفات

أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

- في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث:
 - ألم في منطقة العملية.
 - اضطرابات في حاسة التذوق.
 - نزيف في موقع العملية.
 - تعفن جرثومي مع حمى.
 - دوخة و طنين في الأذن.

المضاعفات الاستثنائية

- تضيق في قناة الأذن الخارجية.
- شلل مؤقت في حركة نصف الوجه.
- التهاب مزمن في الأذن الوسطى او ما يعرف بالسوسة .
- تدهور في السمع يمكن أن يصل إلى فقدان السمع الكامل (الصمم).

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة إصلاح طبلة الأذن ، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم ...) ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

- إغلاق جراحي لثقب طبلة الأذن لتجنب التهاب الأذن الوسطى وتحسين السمع إن أمكن.
- ليس للعملية دور في علاج الطنين الذي يمكن أن يستمر حتى بعد العملية.

مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
- تتم العملية عادة من خلال جرح خلف الأذن أو عبر قناة الأذن الخارجية.
- تختلف تقنية العملية حسب نوع الثقب ووجود التهاب مزمن في الأذن من عدمه.
- يمكن استخدام عدة أنواع من الأنسجة حسب الحالة.
- في بعض الحالات، قد تشمل هذه العملية فحصاً لعظام الأذن وإصلاحه.
- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.