





# استمارة إعلام مريض حول جراحة التهاب الأذن الوسطى المزمن

سيدتي، سيدي،

-التهاب الأذن الوسطى المزمن هو التهاب المنطقة خلف طبلة الأذن التي تسمى الأذن الوسطى. هناك عدة أشكال سريرية لالتهاب الأذن الوسطى المزمن أهمها الورم الكوليسترولي (السوسة) وهو ورم حميد ينتج عن وجود غير طبيعي لخلايا الجلد داخل الأذن الوسطى. يمكن أن ينتج عن التهاب الأذن الوسطى المزمن عدة مضاعفات منها: فقدان السمع الدائم، مشاكل في التوازن، شلل عضلات الوجه، آلتهاب السحايا ....

- للتعرف على جراحة التهاب الأذن الوسطى المزمن ، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفهاماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم ...). ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

#### الهدف من الجراحة

- استكشاف وتنظيف الأذن الوسطى :إزالة الالتهابات واستئصال الورم الكوليسترولي (السوسة)

- تحسين السمع، إذا أمكن : عبر إصلاح طبلة الأذن لضمان إغلاق محكم للأذن الوسطى، واستبدال عظيمات السمع في حال تعرضها للتلف.

#### مراحل الجراحة وما بعدها

تتم هذه الجراحة، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤ لاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والإنعاش قبل العملية.

- تنفذ العملية من خلال جرح خلف الأذن أو عبر قناة الأذن الخارجية.

-ترقيع طبلة الأذن: يمكن أن يعتمد الجراح النسيج العضلي الموجود فوق صيوان الأذن، أو من غضروف

-اصلاح عظيمات الأذن المتضررة: يمكن أن يعتمد الجراح جزء من غضروف الأذن أو أن يستعمل بقاياً عظيمات الأذن أو وضع بديل اصطناعي مكان العظيمات المتضررة.

- لإزالة الورم الكوليسترولي: يضطر الجراح أحيانا إلى توسيع تجويف الاذن الوسطى وفتح خلايا عظام الخشاء وذلك لتسهيل استئصال الورم وتحسين المراقبة بعد الجراحة.

-في نهاية العملية، يقوم الجراح بوضع ضمادات في الأذن (نوع من الإسفنج قد يكون قابل أو غير قابل للامتصاص).

يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص

#### المخاطر والمضاعفات

- أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرّض لحدوث مضاعفات، حتى لو تم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقًا للوائح العلمية المعمول بها.

## المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث:

- تعفن الأذن الذي يجب أن تعلم الطبيب بوجوده.
  - ألام خاصة عند القيام بعملية المضغ.
    - الدوار أو اختلال في التوازن.
      - -طنين في الأذن.

### المضاعفات بعيدة المدى

- عدم تحسن السمع.
- الطنين في الأذن.
- الدوار أو اختلال في التوازن.
- اضطرابات طفيفة في التذوق بعد العملية.
  - حدوث ثقب في ترقيع الطبلة.
- انفصال الصيوان، أو تضيق في القناة السمعية الخارجية.
- في حالة وجود ورم كوليسترولي تجدر الإشارة إلى أن هذه النوعية من الأمراض يمكن أن تتكرر الإصابة بها او ان تترك بعض البقايا منه وهو ما يتوجب مراقبة مطولة وفي بعض الأحيان إجراء عملية جراحية أخرى بعد أشهر او بعد

#### المضاعفات الاستثنائية

- فقدان كلى ونهائي لحاسة السمع في الأذن المصابة.
  - شلل نصفي للوجه.
  - الالتهابات العصبية أو السحائية.