



استمارة إعلام مريض حول جراحة التنظير الوظيفي للجيوب والسلائل الأنفية

- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.

المخاطر والمضاعفات

أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث :

- نزيف حاد أو تجمع كتلة دموية في منطقة العملية كما هو وارد في أي عملية جراحية نادراً ما يكون كثيفاً، و قد يتطلب الأمر تدخلاً لإيقافه أو تصريفه.
- تعفن في موضع الجراحة أو التهاب مع انتفاخ وتورم.
- ظهور ألم، و هو شائع، عادةً ما يكون بسيطاً.

المضاعفات بعيدة المدى

- تشكل الالتصاقات داخل الأنف قد تعيق تدفق الهواء، ليس أمراً استثنائياً و هذا يبرر المراقبة المنتظمة لالتئام الغشاء المخاطي و يمكن تصحيح ذلك بعملية جراحية ثانوية.

-خدر الوجه والثثة بشكل دائم، نادر.

- فقدان حاسة الشم، نادر.

-كما أن هذه العملية لا تحمي من تكرار الحالة المرضية الأصلية.

المضاعفات الخطيرة أو الاستثنائية

تعتبر جراحة الجيوب الأنفية إجراءً آمناً وقليلاً ما تليه مضاعفات، لكن في حالات نادرة قد يحدث ما يلي:

- كدمات على مستوى العين، أضرار في حركة العين أو سيلان الدمع، فقدان البصر.

- تسرب السائل النخاعي المحيط للدماغ والحاجة لإجراء جراحي فوري، التهاب السحايا.

هذه المضاعفات نادرة جداً، مع العلم بأن الحالة المرضية يمكن أن تؤدي إلى البعض منها خلال تطورها التلقائي بدون علاج.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة التنظير الوظيفي للجيوب الأنفية، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر بأي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...). ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

- جراحة التنظير الوظيفي للجيوب الأنفية تعتبر الدعامية الأساسية في علاج العديد من مشاكل الجيوب الأنفية، بما في ذلك:

- * التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو المتكرر، سواء كان بكتيريا أو فطرياً،
- * التهاب الجيوب الأنفية الحاد، خاصة إذا كان لا يستجيب للعلاج الدوائي،
- * السلائل الأنفية، وهي نمو غير طبيعي للأنسجة داخل الجيوب الأنفية.

- هذه الجراحة تساعد في تحسين التهوية والتصريف في الجيوب الأنفية، مما يقلل من الأعراض ويحسن جودة الحياة بشكل عام. كما يمكن من أخذ عينة لتحليل الأنسجة في حالات الأورام، أو إجراء عملية استئصال ورم.

مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.

- يستخدم الجراح منظاراً داخلياً يتم إدخاله عبر الأنف، مما يسمح برؤية الممرات والجيوب الأنفية دون الحاجة إلى شق الجلد.

- تستخدم أدوات صغيرة لإزالة السلائل أو الأنسجة المصابة أو المسدودة أو غيرها.

- يتم وضع تثبيت داخل الأنف بواسطة ضمادة أو شرائط سيلستيك ثم إزالتها حسب الموعد المقرر من الطبيب.