



استمارة إعلام مريض حول جراحة فتح الجيب الأنفي الأوسط

المخاطر والمضاعفات

ي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث :
- نزيف حاد كما هو وارد وعادةً ما يكون بكميات قليلة.
- ظهور ألم، و هو شائع، عادةً ما يكون بسيطاً.
- تجمع كتلة دموية في منطقة الجفن.
- تجمع هواء تحت جلد منطقة الجفن.
- تدميع نتيجة تضرر القنوات الدمعية.

المخاطر بعيدة المدى

- تشكل الالتصاقات داخل الأنف قد تعيق تدفق الهواء، ليس أمراً استثنائياً و هذا يبرر المراقبة المنتظمة لالتئام الغشاء المخاطي و يمكن تصحيح ذلك بعملية جراحية ثانوية.
- سيلان الدم المتواصل.
- تكرار الحالة المرضية الأصلية رغم الجراحة (الحالات المزمنة والأورام).

المضاعفات الخطيرة أو الاستثنائية

نادرا وفي المرحلة المبكرة ما بعد العملية، قد تحدث مشاكل في الرؤية (عدم وضوح، انخفاض أو ازدواج في الرؤية). في هذه الحالة يجب إعلام طبيبك المباشر فوراً.
هذه المضاعفات نادرة ، مع العلم أن الحالة المرضية يمكن أن تؤدي إلى البعض منها خلال تطورها التلقائي بدون علاج.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة فتح الجيب الأنفي الأوسط، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.
- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...). ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

تهدف جراحة فتح الجيب الأنفي الأوسط إلى توسع القناة الطبيعية بين تجويف الجيب الفكي والأنف فتساعد في تحسين التهوية و تصريف الإفرازات إلى تجويف الأنف، مما يقلل من الأعراض، كما يمكن استخدامها لعلاج التهابات الجيوب الأنفية، الأورام أو السلائل.

مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
- تتم هذه العملية عبر الفتحات الطبيعية للأنف، دون ترك ندوب خارجية.
- يستخدم الجراح أدوات بصرية ويعمل تحت التحكم بالمنظار لتوسيع الفتحة الطبيعية للجيب الأنفي وإجراء التدخل المناسب.
- بعد العملية، قد يضطر الجراح إلى وضع فتيل انفي.
- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.
- تتم إزالة الفتيل الأنفي في اجل يحدده الطبيب مع تنظيف الأنف من القشور و المخاط.