



استمارة إعلام مريض حول جراحة الجيب الأنفي الوتدي

المضاعفات الفورية

- في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث :
- نزيف من الأنف و هو وارد وعادةً ما يكون بكميات قليلة جداً.
 - تعفن و يتطلب علاجاً طبياً مناسباً.
 - ظهور ألم، و هو شائع، عادةً ما يكون بسيطاً.

المضاعفات بعيدة المدى

- تشكل الالتصاقات داخل الأنف قد تعيق تدفق الهواء، ليس أمراً استثنائياً و هذا يبهر المراقبة المنتظمة لالتئام الغشاء المخاطي و يمكن تصحيح ذلك بعملية جراحية ثانية.
- خدر الوجه واللثة بشكل دائم، نادر.
- فقدان حاسة الشم، نادر.
- كما أن هذه العملية لا تحمي من تكرار الحالة المرضية الأصلية.

المضاعفات الخطيرة او الاستثنائية

- يعتبر الجيب الوتدي منطقة حساسة لقربه من الشريان السباتي الداخلي والأعصاب البصرية و أغشية الدماغ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات نادرة ولكنها قد تكون خطيرة.
- تسرب السائل الدماغي الشوكي من الأنف (ناتج عن خرق لغشاء الدماغ) مع خطر التهاب السحايا المبكر أو المتأخر هو مضاعفة استثنائية.
 - النزيف الحاد و الغزير مع خطر على الحياة (الناتج عن إصابة الشريان السباتي الداخلي) هو أيضاً نادر جداً، يحدث عادةً أثناء العملية أو بعدها مباشرة.
 - وأخيراً، في حالات نادرة جداً يمكن أن تحدث اضطرابات بصرية خطيرة مع خطر العمى (نتيجة إصابة العصب البصري).
- هذه المضاعفات نادرة جداً، مع العلم بأن الحالة المرضية للجيب الوتدي يمكن أن تؤدي إلى البعض منها خلال تطورها التلقائي بدون علاج.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة الجيب الأنفي الوتدي، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.
- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...). ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

- تهدف جراحة الجيب الأنفي الوتدي إلى:
- الولوج إلى الجيب الوتدي لمعاينته، مع امكانية أخذ عينة لتحليل الأنسجة في حالات الأورام، أو إجراء عملية استئصال ورم.
 - توسيع فتحة الجيب الوتدي لضمان تهويته و تصريف أفضل للمخاط، في حالات الالتهابات الحادة أو المزمنة.

مراحل الجراحة وما بعدها

- تتم هذه الجراحة تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
- يتم التدخل الجراحي من خلال فتحتي الأنف، باستخدام منظار، دون ترك ندوب خارجية. تتمثل جراحة الجيب الوتدي في فتح الجيب الأنفي، للوصول إلى داخله وإجراء التدخل المناسب.
- بعد العملية، قد يضطر الجراح إلى وضع فتيل انفي.
- يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.
- تتم إزالة الفتيل الانفي في اجل يحدده الطبيب مع تنظيف الأنف من القشور و المخاط.

المخاطر والمضاعفات

- أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرّض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.