

استمارة إعلام مريض حول جراحة الجيوب الأنفية الجبهية بالمنظار

المخاطر والمضاعفات

- أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرض لحدوث مضاعفات، حتى لو تم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة قد يحدث:
- النزيف: قد يحدث نزيف حاد يتطلب تدخلاً لإيقافه أو تصريفه.
- تعفن في موضع الجراحة أو التهاب مع انتفاخ وتورم.

المضاعفات بعيدة المدى

- التقشر داخل الأنف، قد يتطلب الرعاية.
- تكون التصاقات في تجويف الأنف، مما يؤدي إلى انسداد الأنف.
- تكرار الحالة الأولية أو تشكيل غشاء مخاطي داخل الجيوب الأنفية، مما يتطلب مراجعة جراحية.

المضاعفات الاستثنائية

مشاكل في حاسة الشم، أو خروج السائل النخاعي من الأنف، ومشاكل بصرية.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة الجيوب الأنفية الجبهية بالمنظار، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.
- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...)، ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

الهدف من الجراحة

تهدف جراحة الجيوب الأنفية الجبهية بالمنظار إلى:
- التدخل التشخيصي: يكون في حال حدوث تعفنات على إثر التهاب حاد في الجيوب الأنفية، حيث تفتح الجيوب الأنفية عن طريق المنظار ثم تؤخذ عينة من البكتيريا المتسببة في الالتهاب قصد تشخيصها كما تمكن العملية من تهوية الجيوب الأنفية وذلك منعا لتكرار الحالة المرضية.
- التدخل العلاجي: قصد علاج الجيوب الأنفية من ورم خبيث أو حميد أو تعفنات.

مراحل الجراحة وما بعدها

تتم هذه الجراحة، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتك المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية.
تتم عملية الدخول إلى الجيوب الأنفية باستعمال المنظار لاستكشاف محتوى الجيوب الأنفية الجبهية وأجراء توسعة قناة التهوية. بعد الانتهاء، يضع الجراح عادة ضمادات داخل الأنف للحد من النزيف، والتي يتم إزالتها لاحقاً. كما يمكن إجراء العملية عبر جرح بالقرب من الحاجب أو داخل الشعر.
يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.