



## استمارة إعلام مريض حول جراحة إغلاق ثقب قاعدة الجمجمة بالمنظار عبر الأنف

بعد الجراحة قد يحتاج المريض الى تصريف السائل النخاعي حيث يساعد ذلك على تخفيض الضغط داخل الدماغ والمحافظة على عملية الترميم و غلق الثقب. يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى والرعاية اللازمة بعد العملية من قبل الجراح المختص.

### المخاطر والمضاعفات

أي تدخل طبي على جسم الانسان، سواء للعلاج أو الاستقصاء أو الكشف، معرّض لحدوث مضاعفات، رغم إجراؤه بعد استكمال شروط الكفاءة والسلامة وفقاً للوائح العلمية المعمول بها.

### المضاعفات الفورية

في أعقاب العملية مباشرة: قد يحدث:  
- نزيف حاد أو تجمع كتلة دموية في منطقة العملية كما هو وارد في أي عملية جراحية نادراً ما يكون كثيفاً و يتطلب الأمر تدخل لإيقافه أو تصريفه.  
- صداع شديد مع امكانية ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.  
- التهاب في السحايا.  
- انتفاخ وتورم في الأنف والعينين.  
انخفاض في كمية السائل النخاعي المحيط بالدماغ وزيادة خطر انكماش الدماغ أسفل الجمجمة.

### المخاطر بعيدة المدى

- ضعف أو فقدان حاسة الشم.  
- ثقب في الحاجز الأنفي.  
- نادراً ما يصبح جرح البطن او الفخذ سميكا وسيئ المنظر.

### المضاعفات الخطيرة او الاستثنائية

- التهاب السحايا مصحوب بتعفن بكتيري في المخ.  
- فشل ترميم الثقب مباشرة او في وقت لاحق.

سيدتي، سيدي،

- للتعرف على جراحة إغلاق ثقب قاعدة الجمجمة بالمنظار عبر الأنف، نرجو منك قراءة هذه الوثيقة المحتوية على معلومات توضيحية، كما يمكن لطبيبك المباشر مدك بالمزيد من التفاصيل الخاصة بحالتك والإجابة على استفساماتك.

- الرجاء إبلاغ الطبيب المباشر باي حالة تحسس خاصة تجاه الادوية (البنيسلين، الاسبرين، مضادات تخثر الدم...). ولا تنس إحضار المستندات الطبية التي بحوزتك مثل اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية.

### الهدف من الجراحة

جراحة ترميم ثقب قاعدة الجمجمة بالمنظار عبر الأنف هي إجراء جراحي حديث يستخدم المنظار للوصول إلى مناطق دقيقة في قاعدة الجمجمة. تتيح هذه الجراحة إجراء التدخلات الضرورية دون الحاجة إلى فتح جراحي كبير و تهدف إلى إغلاق ثقب في قاعدة الجمجمة مسبب في انسكاب السائل الدماغي عن طريق الأنف للحماية من التهابات السحايا.

### مراحل الجراحة وما بعدها

تتم هذه الجراحة في غالب الأحيان، تحت التخدير العام الذي يقوم به طبيب متخصص في التخدير والانعاش. يمكنك طرح تساؤلاتكم المتعلقة بهذه المرحلة من العملية عند القيام بزيارة طبيب التخدير والانعاش قبل العملية. قبل الجراحة بساعات يتم غالباً حقن مادة ملونة (fluoresceine) في السائل النخاعي حتى يساعد على تحديد مكان الثقب.

تتمثل هذه العملية في اغلاق الثقب عبر الأنف باستخدام المنظار دون إجراء جرح خارجي. يتم تحديد موقع الثقب (بتسرب السائل النخاعي في الأنف) وإصلاحه باستخدام غضاريف أو أنسجة من الأنف أو البطن أو الفخذ. يمكن تثبيت هذه الانسجة باستعمال مادة لاصقة.